



Pedicetamol[®]

Paracetamolum 100 mg/ml, roztwór doustny

DAWKOWANIE

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w mililitrach (ml)

Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml)

Dawka w ml	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	ml
Masa ciała w kg	2,7	3,3	4	4,7	5,3	6	6,7	7,3	8	8,7	9,3	10	10,7	11,3	12	12,7	13,3	kg
Orientacyjny wiek w miesiącach	Od 0 do 3			Od 4 do 8			od 9 do 11		od 12 do 23			od 24 do 36					m-cy	

Dawka w ml	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8	ml
Masa ciała w kg	14,7	16	17,3	18,7	20	21,3	22,7	24	25,3	26,7	28	29,3	30,7	32	kg
Orientacyjny wiek w latach	4 do 5				6 do 8				9 do 10						lat

Dawkowanie co 4 godziny w mililitrach (ml):

Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny.

Dawka w ml	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	ml
Masa ciała w kg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	kg
Orientacyjny wiek w miesiącach	Od 0 do 3		Od 4 do 8			Od 9 do 11		Od 12 do 23		Od 24 do 36		m-cy

Dawka w ml	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	ml
Masa ciała w kg	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32	kg
Orientacyjny wiek w latach	Od 4 do 5				Od 6 do 8				Od 9 do 10					lat